



LIZETAN PLUS COMBISTÄBCHEN

Die neuen Lizetan Plus Combistäbchen mit der 2 in 1 Wirkung schützen Ihre Zierpflanzen nicht nur vor saugenden Schädlingen (z. B. Blattläuse und Weiße Fliege), sondern versorgen sie zusätzlich mit den wichtigsten Nährstoffen. Die spezielle Kombination aus Pflanzenschutzmittel plus Dünger sorgt dafür, dass die Pflanze sich bei einem Schädlingsbefall schnell wieder regeneriert und ihr gesundes Aussehen mit satt-grünen Blättern und bis zu 3 mal mehr Blüten zurückerlangt.

VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE

ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Blattläuse und Weiße Fliege an Zierpflanzen in Zimmern, Büroräumen und Wintergärten.

Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zulässig.

Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

SYSTEMISCHE WIRKUNG

- Wirkstoff verteilt sich nach Aufnahme über die Wurzeln in der Pflanze
- Versteckt lebende Schädlinge werden besser erfasst

ANWENDUNG

Das Stäbchen wird vollständig in das feuchte Substrat innerhalb der Wurzelzone eingebracht. Nach dem Einsetzen gründlich wässern. Die Anwendung erfolgt bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. Maximal eine Anwendung je Kultur und Vegetationsperiode.



Wirkung über die Wurzeln

Kultur	Anwendungsbereich	Topfdurchmesser	Anwendungsmenge
Zierpflanzen	Zimmer, Büroräume und Wintergärten	10–12 cm	1 Combistäbchen*
		13–15 cm	2 Combistäbchen*
		16–18 cm	4 Combistäbchen*
		19–20 cm	6 Combistäbchen*
		21–23 cm	8 Combistäbchen*

* pro Topf. Generelle Aufwandmenge: 2 Stäbchen/l Erde

PFLANZENVERTRÄGLICHKEIT

Lizetan Plus Combistäbchen werden von folgenden Pflanzen sehr gut getragen: Helianthus annuus, Chrysanthemum sp., Gerbera jamesonii, Argemone frutescens, Bidens ferulifolia, Begonia-Elatior Hybride, Begonia semperflorens Hybride, Brassica oleracea capitata, Kalanchoe blossfeldiana, Euphorbia pulcherrima, E. hypericifolia, Pelargonium zonale Hybride, Salvia sp., S. splendens, Coleus sp., Nephrolepis cordifolia, Fuchsia Hybride, Cyclamen persicum, Adiantum radicans, A. tenerum, Rosa sp., Capsicum annuum, Calibrachoa parviflora, Lantana camara, Verbena hybrids, Viola tricolor. Wirkstoff: Flupyradifuron. Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 4D

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN UMGANG

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Beim Umgang mit dem Mittel Schutzhandschuhe tragen. Haustiere fernhalten. Das Produkt ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Für DE gilt: Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Populationen relevanter Nutzorganismen und Bienen nicht gefährdet (B3). Mittel und dessen Reste, entleerte Behälter sowie oder Packungen sowie Spüflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. Für AT gilt: Produkt kann Bodenorganismen schädigen. Schädlich für Nutzlinge. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

Für Folgen nicht bestimmungsgerechter und unsachgemäßer Anwendung haften wir nicht.

LAGERUNG

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Für Kinder und Haustiere unzugänglich/unreichbar aufbewahren. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen und Etikett und Verpackung vorzeigen.

ABFALLBESEITIGUNG

Restentleerte Packungen der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste nicht dem Hausmüll beigemischen, sondern in Originalverpackung bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften abliefern. Gegebenenfalls die Stadt- oder Kreisverwaltung um Auskunft bitten. Gebrauchte Packungen nicht wiederverwenden.

Insektizid, Stäbchen (PR)

Wirkstoff: Flupyradifuron 18,8 g/kg (1,88 %)

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Verkehrbringer Deutschland: SBM Life Science GmbH, Raiffeisenstraße 15a, 40764 Langenfeld, Deutschland, www.protect-garden.de Service-Tel. für Anwendungsfragen: +49 (0) 800 / 1 52 29 37 (Kostenlos Service aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetze können abweichen.)

Verkehrbringer Österreich: SBM Life Science Austria GmbH Gaumannsgasse 2, 1010 Wien, Österreich Service-Tel. (AT): +43 (0) 5 / 99 77 100 Vergiftungsinformationszentrale (AT): +43 (0) 1 / 4 06 43 43



EG-Düngemittel: NPK-Dünger, der Crotonylidindiharnstoff enthält, 7-4-6

Gesamt-Stickstoff (N) 7,4 %, davon Ammoniumstickstoff-N 1,9 %, Amidstickstoff-N 1,65 %, Crotonylidindiharnstoff-N 3,85 %, Phosphat gesamt (neutral-ammonitricatrisches P₂O₅) 3,55 %, Kaliumoxid (wasserlösliches K₂O) 5,7 %, Eisen gesamt (Fe) 0,33 %, Magnesiumoxid (wasserlösliches MgO) 1,4 %, Schwefeloxid (SO₂) 3,15 %

Vertriebspartner Österreich: Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Österreich, Tel.: +43 (0) 5 / 99 77 100

Zulassungsinhaber: SBM Development SAS, 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Frankreich

Chargen-Nr. und Herstelldatum s. gesonderte Prägung

Inhalt: 20 Stäbchen à 2 g (40 g netto e)



Nr.: 00864-00
Pfl.Reg.Nr.(AT): 3977-0

5553820Ea

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel! Abgabe nur in Originalpackung.

Wenn's wirken soll...

www.protect-garden.de

